

手軽に塗れる

チックタイプ

使用方法

① 上部のキャップをはずしてください。



② 下部の回転部を右へ回し、薬剤を3~4mm出してください。

③ 適量を患部に塗擦してください。



※揮発性が強いので、ご使用後は必ずキャップをしめて保管してください。

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造番号

使用期限

RAKOOL

第2類医薬品

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛剤

インペタン チックPX

容量 37g

手を汚さず塗れるスティック剤

ピロキシカム 0.5% 製剤

チック容器



肩

腰

痛み!

筋肉

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

・1日3~4回適量を患部に塗擦してください(キャップをとり、容器底部を回し、薬剤を3~4mm出して使用してください。)

・15歳未満の小児は使用しないでください<用法・用量に関連する注意>

- (1)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (2)外用にのみ使用してください。(3)本剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。(4)1週間当たり50gを超えて使用しないでください。(5)定められた用法を守ってください。

【成分・分量】100g中

ピロキシカム…0.5g l-メントール…3.0g
添加物:ハアセチルしよ糖、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸Na、pH調節剤、1,3-ブチレングリコール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4)衣類等に着色することがありますので、皮膚によく擦りこむ等注意してください。(5)火気に近づけないでください。(6)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。(7)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

ここから
開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (4)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3)みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、水疱、落屑(皮ふ片の細かい脱落)、光線過敏症(日光が当たった部位に起こる発疹や水ぶくれ等の炎症)

3. 1~2週間使用しても症状がよくなりないう場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください