

ここから
開けてください

第2類医薬品

販売名 インペタン1%ミルリィーゲル

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

[使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

[効能・効果]

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

[用法・用量]

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 11歳以上の中児に使用される場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 11歳未満の中児には

使用させないでください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 1週間当たり50gを超えて使用しないでください。(6) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。(7) 定められた用法・用量をお守りください。

RAKOO

第2類医薬品

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛剤

インペタン

1%ミルリィーゲル

大容量

80g

【成分・分量】100g中
インドメタシン……1,000mg
0-メントール……3,000mg
添加物:イソプロパノール、マクロゴール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、プロビレングリコール、ポリソルベート80、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、チオ硫酸Na水和物、亜硫酸水素Na、pH調節剤

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかねないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。

(4) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。(5) 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。(6) 使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



4 987435 505392



薬
械
器具
加
熱